Ingeniería Genética II

Clonado molecular

Ciencia

Tecnología

Ciencia

Tecnología

- Objeto de estudio
- Recortes
- Métodos
- Registro de evidencias
- Uso de lenguajes abstractos
- Sistematización de la información

- Objeto/Área de intervención
- Construcción
- (bien/servicio → herramientas)
- Evaluación de capacidades y límites
- Extensiones biológicas

El conocimiento es intangible

El conocimiento es relativo

Las tecnologías son tangibles

Las tecnologías son reemplazables

Biología

Biotecnología

Genética

Ingeniería Genética

Construcción de Ciencia y Tecnología

(o construcción de conocimientos y capacidades)

I+D+i

Bien/servicio en el mercado

I+D+i

Bien/servicio en el mercado

Conocimientos
(papers)

I+D+i

Bien/servicio en el mercado

Pruebas de concepto
(papers, patentes)

Conocimientos
(papers)

I+D+i

Bien/servicio en el mercado

I+D+i

I+D+i

Bien/servicio en el mercado

Financiamiento

Ingeniería genética

**Construcciones
genéticas**

Estudio de:

- *...la información contenida en la materia viva;*
- *su sintaxis;*
- *y sus mecanismos de transmisión.*

CONOCIMIENTO

El conocimiento es intangible

El conocimiento es relativo

Aplicación basada en la:

- *...creación o recreación de información genética;*
- *respetando sintaxis;*
- *e implantándola en materia viva.*

BIEN/SERVICIO

Las tecnologías son tangibles

Las tecnologías son reemplazables

La información: deconstrucción

TEXTO

PÁRRAFO

ORACION

PALABRA

LETRA

GENOMA

**CIRCUITO
GÉNICO**

GEN

**BIOBRICK
GÉNICO**

NUCLEÓTIDO

**SISTEMA
OPERATIVO**

RUTINA

SUBRUTINA

COMANDO

LETRA

INGENIERÍA GENÉTICA

Aplicación basada en la:

- *...creación o recreación de información genética;*
- *respetando sintaxis;*
- *e implantándola en materia viva.*

BIEN/SERVICIO

Las tecnologías son tangibles

Las tecnologías son reemplazables

INGENIERÍA GENÉTICA

Aplicación basada en la:

- *...creación o recreación de información genética;*
- *respetando sintaxis;*
- *e implantándola en materia viva.*

BIEN/SERVICIO

Las tecnologías son tangibles
Las tecnologías son reemplazables

Materia viva con nuevas (o distintas) actividades o funciones

Punto de partida

INGENIERÍA GENÉTICA

Aplicación basada en la:

- *...creación o recreación de información genética;*
- *respetando sintaxis;*
- *e implantándola en materia viva.*

BIEN/SERVICIO

Las tecnologías son tangibles
Las tecnologías son reemplazables

Inserción genómica o nuevo replicón
↑
Materia viva con nuevas (o distintas) actividades o funciones

Punto de partida

INGENIERÍA GENÉTICA

Aplicación basada en la:

- ...creación o recreación de información genética;
- respetando sintaxis;
- e implantándola en materia viva.

BIEN/SERVICIO

Las tecnologías son tangibles
Las tecnologías son reemplazables

Necesidad de secuencias estandarizadas (*bricks*)

Inserción genómica o nuevo replicón

Materia viva con nuevas (o distintas) actividades o funciones

Punto de partida

INGENIERÍA GENÉTICA

Aplicación basada en la:

- ...creación o recreación de información genética;
- respetando sintaxis;
- e implantándola en materia viva.

BIEN/SERVICIO

Las tecnologías son tangibles
Las tecnologías son reemplazables

Necesidad de métodos de ensamblado

Necesidad de secuencias estandarizadas (*bricks*)

Inserción genómica o nuevo replicón

Materia viva con nuevas (o distintas) actividades o funciones

Punto de partida

INGENIERÍA GENÉTICA

Aplicación basada en la:

- ...creación o recreación de información genética;
- respetando sintaxis;
- e implantándola en materia viva.

BIEN/SERVICIO

Las tecnologías son tangibles
Las tecnologías son reemplazables

CONSTRUCCIÓN GENÉTICA

↑
Necesidad de métodos de ensamblado
↑
Necesidad de secuencias estandarizadas (*bricks*)
↑
Inserción genómica o nuevo replicón
↑
Materia viva con nuevas (o distintas) actividades o funciones

Punto de partida

1
INSULINA HUMANA

Ensamblado

Quimerización de ADN utilizando enzimas

2
Nuevo replicón

transferencia vertical

células de mamífero

1
INSULINA HUMANA

3
Bricks

Quimerización de ADN utilizando enzimas

2
Nuevo replicón

1
INSULINA HUMANA

3
Bricks

4
Ensamblado

Quimerización de ADN utilizando enzimas

2
Nuevo replicón

Aislamiento

transferencia vertical

1
INSULINA HUMANA

Secuencias estandarizadas y sintaxis

Secuencias estandarizadas (bricks) y sintaxis

ABSTRACCIÓN

CARACTERIZACIÓN

ESTANDARIZACIÓN

Secuencias estandarizadas (bricks) y sintaxis

ABSTRACCIÓN

Delimitar de moléculas genómicas naturales **segmentos de DNA** con roles particulares.

CARACTERIZACIÓN

ESTANDARIZACIÓN

Secuencias estandarizadas (bricks) y sintaxis

ABSTRACCIÓN

Delimitar de moléculas genómicas naturales **segmentos de DNA** con roles particulares.

CARACTERIZACIÓN

Caracterizar el rol de los **segmentos de DNA** abstraídos.

ESTANDARIZACIÓN

Secuencias estandarizadas (bricks) y sintaxis

ABSTRACCIÓN

Delimitar de moléculas genómicas naturales **segmentos de DNA** con roles particulares.

CARACTERIZACIÓN

Caracterizar el rol de los **segmentos de DNA** abstraídos.

ESTANDARIZACIÓN

Generar variantes de los **segmentos de DNA** abstraídos y caracterizados.

Secuencias estandarizadas (*bricks*) y sintaxis

Métodos de ensamblado de *bricks*

CLONADO MOLECULAR

El **clonado molecular** es un **conjunto de procedimientos** que permiten generar **quimeras de fragmentos de dsDNA estandarizados** con capacidad de **multiplicación dentro de materia viva**, racionalmente construidas con el objetivo de **producir bienes y/o servicios biotecnológicos**.

Métodos de ensamblado de *bricks*

CLONADO MOLECULAR

El **clonado molecular** es un **conjunto de procedimientos** que permiten generar **quimeras de fragmentos de dsDNA estandarizados** con capacidad de **multiplicación dentro de materia viva**, racionalmente construidas con el objetivo de **producir bienes y/o servicios biotecnológicos**.

El clonado molecular posibilita la creación o recreación de genotipos.

Clonado Molecular tradicional

10 etapas
del clonado
molecular
tradicional

- Identificar objetivo
 - Diseño *in silico*
 - Aislar el vector (*backbone*)
 - Aislar el inserto
 - Apertura del vector
 - Compatibilización de extremos
 - Ligación
 - Transferencia horizontal a *Escherichia coli*
 - Selección de Bact/vector
 - Selección de Bact/construcción
- In silico*
- In vitro*
- In vivo*
-
- The diagram illustrates the 10 steps of traditional molecular cloning, grouped into three phases: *In silico*, *In vitro*, and *In vivo*. The *In silico* phase includes identifying the objective and *in silico* design. The *In vitro* phase includes isolating the vector backbone and insert, opening the vector, and end compatibility. The *In vivo* phase includes horizontal transfer to *Escherichia coli*, selection of bacteria/vector, and selection of bacteria/construction.

Clonado molecular

Clonado molecular

- Identificar objetivo
 - Diseño *in silico*
 - Aislar el vector
 - Aislar el inserto
 - Apertura del vector
 - Compatibilización de extremos
 - Ligación
 - Transferencia horizontal
 - Selección de Bac/vector
 - Selección de Bac/construcción Recombinante
-
- The diagram uses blue brackets on the right side to group the steps into three categories:
- In silico:** This category includes the first two steps: 'Identificar objetivo' and 'Diseño *in silico*'.
 - In vitro:** This category includes the next six steps: 'Aislar el vector', 'Aislar el inserto', 'Apertura del vector', 'Compatibilización de extremos', 'Ligación', and 'Transferencia horizontal'.
 - In vivo:** This category includes the final three steps: 'Selección de Bac/vector' and 'Selección de Bac/construcción Recombinante'.

Clonado molecular

- Identificar objetivo
- Diseño *in silico*

In silico

- *Formulación de objetivos*
- *Boceto*
- *Selección de bricks en acuerdo con boceto*
- *Mapa de la construcción con software (incluyendo el diseño de todos los primers necesarios)*

Clonado molecular

- Identificar objetivo
 - Diseño *in silico*
 - **Aislar el vector**
 - Aislar el inserto
 - Apertura del vector
 - Compatibilización de extremos
 - Ligación
 - Transferencia horizontal
 - Selección de Bac/vector
 - Selección de Bac/construcción Recombinante
- In silico*
- In vitro*
- In vivo*
-

Clonado molecular

Aislamiento del vector

- Los vectores más utilizados en las construcciones genéticas son los plásmidos.
- Recordemos como es la constitución básica de los plásmidos de clonado...

Clonado molecular

Aislamiento del vector

Clonado molecular

Aislamiento del vector

Aislamiento de una macromolécula biológica

- A** Obtención de BIOMASA (fuente de la macromolécula)
- B** Disgregamiento/Disrupción celular
- C** Separaciones diferenciales
- D** Concentración

Clonado molecular

Aislamiento del vector

El protocolo por excelencia para aislar plásmidos a partir de bacterias es la *Miniprep por lisis alcalina*

Clonado molecular

Aislamiento del vector

A

- 1) Inocular Bacterias en 5 ml de medio de cultivo suplementado con el antibiótico correspondiente (Medio Luria Bertani, comúnmente denominado LB).
- 2) Incubar ON (*Over Night*) a 37°C y 200 rpm.
- 3) Concentrar *pellet* bacteriano por centrifugación (14000 rpm, 30 segundos)
- 4) Resuspender las bacterias en 200 ul de **Solución I** (Glucosa 50 mM, Tris-HCl 25 mM, EDTA 10 mM; pH 8).

B

- 5) Agregar 300 ul de **Solución II** (SDS 1%, NaOH 0,2 N). Mezclar por inversión.

C

- 6) Agregar 300 ul de **Solución III** (Mezcla de Acetato de K y Ácido Acético, pH 5,2). Mezclar por inversión. Agregar RNAsa A.
- 7) Centrifugar y recuperar fase líquida (14000 rpm, 10 minutos).
- 8) Extraer con solventes orgánicos (Fenol:cloroformo y/o cloroformo). Recuperar fase acuosa.

D

- 9) Concentrar por precipitación alcohólica agregando 1 volumen de isopropanol e incubando 15 minutos en frío.
- 10) Centrifugar (14000 rpm, 15 minutos), lavar el pellet de DNA con Etanol 70 %, secar y disolver en 20 ul de agua.

Clonado molecular

Aislamiento del vector

Actualmente existe la alternativa de **kits comerciales**, los cuales estandarizan la *miniprep* por *lisis alcalina*. La diferencia principal respecto al protocolo tradicional es la utilización de matrices cromatográficas para aislar el DNA luego de utilizar las soluciones I, II y III.

Clonado molecular

Aislamiento del vector

Diagnóstico analítico del aislamiento de plásmido

ELECTROFORESIS
(gel de agarosa)

CUANTIFICACIÓN
(DO 260 nm)

Clonado molecular

Aislamiento del vector

ELECTROFORESIS
(gel de agarosa 0,8%)

Clonado molecular

Aislamiento del vector

ELECTROFORESIS
(gel de agarosa 0,8%)

Relajado ←
Lineal ←
Superenrollado negativo ←

Electroforesis en gel de agarosa 0,8%,
teñido con Bromuro de Etidio y exposición a UV

Clonado molecular

- Identificar objetivo
 - Diseño *in silico*
 - Aislar el vector
 - **Aislar el inserto**
 - Apertura del vector
 - Compatibilización de extremos
 - Ligación
 - Transferencia horizontal
 - Selección de Bac/vector
 - Selección de Bac/construcción Recombinante
- In silico*
- In vitro*
- In vivo*
-

Clonado molecular

Aislamiento del inserto

- El inserto de una construcción genética debe ser un dsDNA.
- La fuente del inserto puede ser diversa, pero en general podemos clasificarla en dos grupos: **origen natural** u **origen sintético**.
- Es muy importante considerar la fuente del inserto para identificar el tipo de extremos que tiene la molécula.

Clonado molecular

Aislamiento del inserto

Tipos de insertos

Y combinaciones...

ER: extremo de digestión con endonucleasas; **M:** extremo de fragmentación mecánica; **SE:** Extremo de síntesis enzimática; **SQ:** Extremo de síntesis

Clonado molecular

Aislamiento del inserto: Fuentes naturales

Aislamiento de molécula genómica

Clonado molecular

Aislamiento del inserto: Fuentes naturales

Aislamiento de una macromolécula biológica

- A** Obtención de BIOMASA (fuente de la macromolécula)
- B** Disgregamiento/Disrupción celular
- C** Separaciones diferenciales
- D** Concentración

Clonado molecular

Aislamiento del inserto: Fuentes naturales

BIOMASA

Virus

Células libres

Órganos o partes

Disgregamiento (enzimático y/o mecánico)

Disrupción o lisis (detergentes, proteinasas)

Clonado molecular

Aislamiento del inserto: Fuentes naturales

Separaciones diferenciales

Concentración (precipitación alcohólica)

Diagnóstico de calidad y cantidad

Fraccionamiento

Enzimático

Mecánico

Clonado molecular

Aislamiento del inserto: Fuentes naturales

Fraccionamiento

Enzimático

Mecánico

Fraccionamiento con
Endonucleasas de Restricción

Fraccionamiento con
métodos físicos

Reacción enzimática

Pasaje por jeringa

nebulizador

vortex

sonicador

Clonado molecular

Aislamiento del inserto: Fuentes naturales

Clonado molecular

Aislamiento del inserto: Fuentes naturales

Se cortan los tacos de agarosa con el fragmento de interés

Clonado molecular

Aislamiento del inserto: Fuentes naturales

Taco de agarosa con fragmentos

Tubo con taco

Tubo con taco + caótopo + calor

Solución
caótopo

Solución
caótopo

- Ioduro de sodio saturante
- Perclorato de sodio
- Sales de tiocianato

espectrofotómetro

microcentrífuga

Clonado molecular

Aislamiento del inserto: Fuentes naturales

Fragmentación enzimática

Clonado molecular

Aislamiento del inserto: Fuentes naturales

Fragmentación mecánica

Clonado molecular

Aislamiento del inserto: Fuentes artificiales

Necesidad de DNA original
como molde de reacción

Clonado molecular

Aislamiento del inserto: Fuentes artificiales

Síntesis química de oligonucleótidos

Clonado molecular

Aislamiento del inserto: Fuentes artificiales

Generación enzimática de dsDNA

Fuente natural

Fuente natural

Clonado molecular

Aislamiento del inserto: Fuentes artificiales

termociclador

PCR

Electroforesis

Amplicón aislado a partir de gel

Clonado molecular

Aislamiento del inserto: Fuentes artificiales

Síntesis enzimática en ausencia de fuente natural

50 - 100 nt c/u

Incubar a 95 °C

Incubar a 60 °C

Incubar con *Taq* pol y
Taq ligasa

dsDNA
en solución

Clonado molecular

- Identificar objetivo
 - Diseño *in silico*
 - Aislar el vector
 - Aislar el inserto
 - **Apertura del vector**
 - **Compatibilización de extremos**
 - Ligación
 - Transferencia horizontal
 - Selección de Bac/vector
 - Selección de Bac/construcción Recombinante
- In silico*
- In vitro*
- In vivo*
-
- ```
graph TD; subgraph In_silico [In silico]; S1[Identificar objetivo]; S2[Diseño in silico]; end; subgraph In_vitro [In vitro]; S3[Aislar el vector]; S4[Aislar el inserto]; S5[Apertura del vector]; S6[Compatibilización de extremos]; S7[Ligación]; end; subgraph In_vivo [In vivo]; S8[Transferencia horizontal]; S9[Selección de Bac/vector]; S10[Selección de Bac/construcción Recombinante]; end;
```

# Clonado molecular

Apertura del plásmido y compatibilización de extremos

# Clonado molecular

## Apertura del plásmido y compatibilización de extremos

| Reactivo            | Volumen                     |
|---------------------|-----------------------------|
| Buffer Reacción 10X | 1 $\mu$ l                   |
| Plásmido            | 1 $\mu$ g (vol. necesario)  |
| ER (10 U/ $\mu$ l)  | 2-5 unidades                |
| H <sub>2</sub> O    | c.s.p.                      |
| <b>Vf</b>           | <b>10 <math>\mu</math>l</b> |

Incubar a temperatura de reacción: 1-4 horas  
Inactivar 20 minutos a 75°C

# Clonado molecular

Apertura del plásmido y compatibilización de extremos

10  $\mu$ l  
Digestión enzimática  
plásmido

Electroforesis  
Analítica  
(1-2  $\mu$ l)

# Clonado molecular

Apertura del plásmido y compatibilización de extremos

Plásmido S/D  
Plásmido ER1  
Plásmido ER2  
Plásmido ER1/ER2

# Clonado molecular

## Apertura del plásmido y compatibilización de extremos

Compatibilización de extremos (modificar a Romo)

# Clonado molecular

## Apertura del plásmido y compatibilización de extremos

| Reactivo <i>Fill in</i> | Volumen                      |
|-------------------------|------------------------------|
| Buffer Reacción 10X     | 1 $\mu$ l                    |
| Plásmido lineal         | 100 ng (vol. necesario)      |
| dNTP's                  | 100 $\mu$ M <sub>final</sub> |
| Klenow (1 u/ $\mu$ l)   | 1 unidad                     |
| H <sub>2</sub> O        | c.s.p.                       |
| <b>Vf</b>               | <b>10 <math>\mu</math>l</b>  |

Incubar a 37 °C: 15 minutos

Inactivar 20 minutos a 75°C. Extraer con solventes. Precipitación alcohólica

En caso de extremos 3' extendidos, primero incubar sin dNTPs, y luego con dNTP's

# Clonado molecular

## Apertura del plásmido y compatibilización de extremos

- En resumen, el plásmido debe linearizarse con ER adecuadas, dejando los extremos compatibles para la ligación al inserto.
- En caso que no existan cohesivos compatibles puede modificarse a la molécula plasmídica, como corregir los extremos de las moléculas inserto para facilitar su posterior clonado.

# Clonado molecular

## Apertura del plásmido y compatibilización de extremos

Modificación de extremos de los fragmentos de dsDNA obtenidos por fragmentación mecánica

Fragmentación mecánica

dsDNA con extremos diversos

dsDNA con extremos romos

Siempre luego de modificar, es necesario extraer con solventes orgánicos y precipitar.

# Clonado molecular

## Apertura del plásmido y compatibilización de extremos

Modificación de extremos de los fragmentos de dsDNA obtenidos por PCR utilizando Taq DNA pol

dsDNA con  
extremos 3'ext

dsDNA con  
extremos romos

Siempre luego de modificar, es necesario extraer con solventes orgánicos y precipitar. Si se desea fosforilar los extremos, es preciso tratar con PNK y ATP en condiciones de reacción adecuadas.

# Clonado molecular

## Apertura del plásmido y compatibilización de extremos

Modificación de extremos de los fragmentos de dsDNA obtenidos por PCR, cuando se incorporaron secuencias de reconocimiento a Enzimas de Restricción en los *primers*

Tratar al producto de amplificación con las endonucleasas de restricción adecuadas

Siempre luego de modificar, es necesario extraer con solventes orgánicos y precipitar. Si se desea fosforilar los extremos, es preciso tratar con PNK y ATP en condiciones de reacción adecuadas.

# Clonado molecular

- Identificar objetivo
  - Diseño *in silico*
  - Aislar el vector
  - Aislar el inserto
  - Apertura del vector
  - Compatibilización de extremos
  - **Ligación**
  - Transferencia horizontal
  - Selección de Bac/vector
  - Selección de Bac/construcción Recombinante
- 
- The diagram uses blue brackets on the right side to group the steps into three categories:
- In silico**: Includes 'Identificar objetivo' and 'Diseño *in silico*'.
  - In vitro**: Includes 'Aislar el vector', 'Aislar el inserto', 'Apertura del vector', 'Compatibilización de extremos', and 'Ligación'.
  - In vivo**: Includes 'Transferencia horizontal', 'Selección de Bac/vector', and 'Selección de Bac/construcción Recombinante'.

# Clonado molecular

Ligación entre el vector lineal y el inserto

Una vez obtenidas las **moléculas de plásmido lineal e inserto**, en ambos casos **con extremos compatibles** (romos o cohesivos compatibles), se procede con la etapa de **ligación enzimática**.

# Clonado molecular

## Ligación entre el vector lineal y el inserto

Ya disponibles vector lineal e insertos (ambos compatibles y de concentración conocida), se procede a establecer la relación molecular entre ambas moléculas.

$$\frac{\text{ng inserto}}{\text{pb inserto}} = R \quad \frac{\text{ng plásmido}}{\text{pb plásmido}} \quad 3 < R < 10$$

Esta cuenta deriva de relacionar el número de moléculas de plásmido e inserto.

# Clonado molecular

## Ligación entre el vector lineal y el inserto

Ya disponibles vector lineal e insertos (ambos compatibles y de concentración conocida), se procede a establecer la relación molecular entre ambas moléculas.

$$\frac{\text{ng inserto}}{\text{pb inserto}} = R \frac{\text{ng plásmido}}{\text{pb plásmido}}$$

(Incógnita) (Usualmente 10-50 ng)

(Dato conocido) (Dato conocido)

$3 < R < 10$

Extremos cohesivos Extremos romos

Esta cuenta deriva de relacionar el número de moléculas de plásmido e inserto.

# Clonado molecular

Ligación entre el vector lineal y el inserto

| Reactivo <i>Ligación</i>  | Volumen                     |
|---------------------------|-----------------------------|
| Buffer Reacción 10X       | 1 $\mu$ l                   |
| Plásmido lineal           | 10 ng (vol. necesario)      |
| Inserto                   | Ver fórmula anterior        |
| DNA ligasa (1 U/ $\mu$ l) | 1 unidad                    |
| H <sub>2</sub> O          | c.s.p.                      |
| <b>Vf</b>                 | <b>10 <math>\mu</math>l</b> |

Incubar a 22 °C: 1 hora; o a 16°C: 4 horas; o a 4°C: ON.

# Clonado molecular

## Ligación entre el vector lineal y el inserto

- Las ligaciones a bajas temperaturas son recomendables para moléculas con extremos romos.
- A su vez, para optimizar aún más la ligación, es posible adicionar PEG<sub>8000</sub> al 15% para disminuir la movilidad de las moléculas.
- Recordar que sólo se catalizará la formación de enlaces fosfodiéster si existe un grupo fosfato 5' y un grupo OH en el 3' de cada molécula.

# Clonado molecular

Ligación entre el vector lineal y el inserto

Principales moléculas obtenidas durante la ligación del plásmido lineal con el inserto.

Plásmido lineal

+

Inserto

# Clonado molecular

## Ligación entre el vector lineal y el inserto

Principales moléculas obtenidas durante la ligación del plásmido lineal con el inserto.

Como estrategia para disminuir la presencia de moléculas no deseables puede **desfosforilarse el vector lineal** antes de someterlo a ligación con el inserto.

Esto no puede realizarse para el caso donde el inserto sea un amplicón de PCR, dado que este tipo de moléculas no suele estar fosforilado en sus extremos.

# Clonado molecular

- Identificar objetivo
  - Diseño *in silico*
  - Aislar el vector
  - Aislar el inserto
  - Apertura del vector
  - Compatibilización de extremos
  - Ligación
  - **Transferencia horizontal**
  - Selección de Bac/vector
  - Selección de Bac/construcción Recombinante
- 
- The diagram uses blue brackets on the right side to group the steps into three phases:
- In silico**: Includes 'Identificar objetivo' and 'Diseño *in silico*'.
  - In vitro**: Includes 'Aislar el vector', 'Aislar el inserto', 'Apertura del vector', 'Compatibilización de extremos', and 'Ligación'.
  - In vivo**: Includes 'Transferencia horizontal', 'Selección de Bac/vector', and 'Selección de Bac/construcción Recombinante'.

# Clonado molecular

## Transferencia horizontal a bacterias

- Una vez ligadas las moléculas de vector e inserto, es preciso transferirlas a bacterias para así posibilitar su aislamiento y multiplicación.
- Para este fin, existen cepas de laboratorio de *Escherichia coli*, las cuales son inocuas para el ser humano y deficientes para la supervivencia en la naturaleza.
- El mecanismo de ingreso del DNA a la bacteria se denomina **Transformación**, fenómeno natural que es mimetizado en condiciones de laboratorio.

# Clonado molecular

Transferencia horizontal a bacterias

# Clonado molecular

Transferencia horizontal a bacterias

# Clonado molecular

Transferencia horizontal a bacterias

# Clonado molecular

Transferencia horizontal a bacterias

Algunas cepas de *Escherichia coli* utilizadas en el clonado molecular

| Cepa                          | Rec A | Lac I              | Proteasas |
|-------------------------------|-------|--------------------|-----------|
| <b>Top10</b>                  | -     | -                  | ND        |
| <b>DH5<math>\alpha</math></b> | -     | +                  | ND        |
| <b>XL1-Blue</b>               | -     | Lac I <sup>q</sup> | ND        |
| <b>BL21</b>                   | -     | +                  | Muy bajo  |
| <b>LE392</b>                  | +     | +                  | ND        |

# Clonado molecular

## Transferencia horizontal a bacterias

- La **transformación** se puede realizar por ***shock térmico*** o ***shock eléctrico***.
- En ambos casos, previamente las bacterias deben ser tratadas para inducir el **estado de competencia** a la transformación.
- Siempre, es necesario que en la transformación se encuentre un **exceso de bacterias a DNA** para así asegurar que cada UFC deriva del ingreso de una única molécula de cccdsDNA.
- Luego de transformar, es necesario incubar a las bacterias sin selección con el antibiótico correspondiente para permitir la expresión del fenotipo de resistencia.

# Clonado molecular

## Transferencia horizontal a bacterias

**Shock eléctrico**

Mezcla de ligación + bacterias competentes

Pasar las bacterias a la cubeta de electroporación

Someter a *shock* eléctrico

Agregar medio líquido sin antibiótico e incubar 1 hora a 37 °C

Plaquear en medio sólido suplementado con antibiótico

# Clonado molecular

Transferencia horizontal a bacterias

Electroporación

Electroporador

Cuvetas

# Clonado molecular

## Transferencia horizontal a bacterias

# Clonado molecular

- Identificar objetivo
  - Diseño *in silico*
  - Aislar el vector
  - Aislar el inserto
  - Apertura del vector
  - Compatibilización de extremos
  - Ligación
  - Transferencia horizontal
  - Selección de Bac/vector
  - Selección de Bac/construcción Recombinante
- In silico*
- In vitro*
- In vivo*
- 
- The diagram illustrates the classification of molecular cloning steps into three phases: *In silico*, *In vitro*, and *In vivo*. The steps are listed on the left, and blue brackets on the right group them into these phases. The *In silico* phase includes 'Identificar objetivo' and 'Diseño *in silico*'. The *In vitro* phase includes 'Aislar el vector', 'Aislar el inserto', 'Apertura del vector', 'Compatibilización de extremos', and 'Ligación'. The *In vivo* phase includes 'Transferencia horizontal', 'Selección de Bac/vector', and 'Selección de Bac/construcción Recombinante'. The last three steps are bolded in the original image.

# Clonado molecular

## Selección de la construcción recombinante

- Una vez transformada la mezcla de ligación en bacterias adecuadas, y luego de incubar 1 hora a 37°C para posibilitar la expresión del fenotipo de resistencia al antibiótico, debe sembrarse una alícuota sobre medios de cultivo LB sólido suplementado con el antibiótico correspondiente (más cualquier otro agregado dependiendo del plásmido utilizado y de su sistema de selección de recombinantes).
- La incubación debe hacerse ON en estufa a 37°C, período de tiempo necesario para el establecimiento de UFC visibles.
- El análisis fenotípico de las UFC, y un posterior análisis genotípico de los plásmidos que éstas contienen, serían los pasos finales para dar con la construcción quimérica deseada.

# Clonado molecular

## Selección de la construcción recombinante

### Diagnóstico genotípico

- Aislamiento de plásmidos mediante *miniprep* por lisis alcalina.
- Verificación de tamaños de plásmidos mediante electroforesis.
- Reacciones de PCR con *primers* específicos del inserto.
- Mapas físicos de restricción para corroborar identidad.
- Hibridación con sondas específicas para corroborar identidad.
- Reacciones de secuenciación para corroborar identidad.

# Clonado molecular

## Selección de la construcción recombinante

### Diagnóstico genotípico

- Aislamiento de plásmidos mediante *miniprep* por lisis alcalina.
- Verificación de tamaños de plásmidos mediante electroforesis.

# Clonado molecular

## Selección de la construcción recombinante

### Diagnóstico genotípico

- Reacciones de PCR con *primers* específicos del inserto.
- Mapas físicos de restricción para corroborar identidad.

PCR

Mapa físico

# Clonado molecular

## Selección de la construcción recombinante

### Diagnóstico genotípico

- Hibridación con sondas específicas para corroborar identidad.
- Reacciones de secuenciación para corroborar identidad.

*Southern Blot*

Reacciones de secuenciación

# Clonado molecular

**CUMPLIR OBJETIVO**